




에이즈 예방을 위한 3가지 약속



올바른 콘돔사용



조기검사



안전한 성관계

익명검사는 안심검사!

보건소 익명검사는 무료입니다. 증상으로는 알 수 없으므로 검사로 감염 여부를 확인하세요.



질병관리본부 콜센터

질병관리본부 에이즈 · 결핵관리과

질병관리본부 홈페이지 www.cdc.go.kr

Q
기존 에이즈 검사와 신속검사의 차이점은 무엇인가요?

A
기존검사는 3~7일이 지나야 하지만 신속검사는 20분만에 확인이 가능합니다.

기존검사는 혈액을 5~10cc채혈 후 3~7일이 지나야 정밀검사 필요 여부를 알 수 있지만, 신속검사는 20분만에 정밀검사 필요 여부를 확인할 수 있습니다.

Q
꼭 감염이 의심되는 일이 있는 지 12주 후에 검사를 받아야 하나요?

A
그렇습니다. HIV 감염이 의심되는 행동을 했다면 그 후 12주가 지나서 검사를 받아야 정확한 결과를 알 수 있습니다.

HIV 감염 초기에는 검사상 음성으로 나오는 기간이 있으며, 검사방법에 따라 기간에 차이가 있으므로 이 기간이 검사결과에 영향을 미칠 수 있습니다.

에이즈 궁금증 해결하기!

Q
콘돔은 효과적인 에이즈 예방법이다?

A
그렇습니다. 콘돔은 손쉽게 이용할 수 있는 효과적인 에이즈 예방법입니다.

성관계를 하는 동안 콘돔을 올바르게 계속적으로 사용해 왔다면, 에이즈에 감염될 위험성은 거의 없습니다.

우리나라의 경우 성관계로 인한 감염이 99% 이상으로 올바르게 콘돔을 사용하여 HIV/AIDS를 예방하는 것이 중요합니다.

올바른 콘돔사용법 꼭 알아두세요!

- 유통기한 확인
- 윤활제는 반드시 수용성 사용
- 재사용 금지



에이즈 바로알기



바로 알고 검사 받자!

